

Аналитическая геометрия

Модуль 1. Матричная алгебра.

Векторная алгебра

Текст 1.1

Аннотация

Определитель квадратной матрицы. Вычисление определителей 1-ого, 2-ого и 3-его порядков. Свойства определителей. Миноры и алгебраические дополнения элементов определителя. Вычисление определителя произвольного порядка путем его разложения по строке или столбцу (теорема разложения). Теорема аннулирования.

1 Определитель матрицы

Определитель является характеристикой исключительно квадратных матриц.

Определение

Определителем квадратной матрицы называется число, вычисляемое по заданному правилу из элементов данной матрицы.

Если $A = (a_{ij})$ - это квадратная матрица порядка n , то ее определитель называется определителем n -го порядка и записывается в виде:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Употребляются также следующие обозначения:

$$\det A, \Delta A, |A|.$$

Приведем правила вычисления определителей порядков 1, 2 и 3:

1. $n = 1$

$A = (a_{11})$ - матрица, состоящая только из одного элемента a_{11} .

Тогда $\det A = a_{11}$.

Пример.

$A = (3), \det A = 3$.

2. $n = 2$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Определитель 2-ого порядка вычисляется как произведение элементов главной диагонали минус произведение элементов побочной диагонали.

Пример.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = -1.$$

3. $n = 3$

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} -$$

$$-a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{21}a_{12}a_{33}.$$

Данная формула называется **правилом треугольников**. Название формулы обусловлено ее геометрической интерпретацией.

Элементы, произведения которых входят в определитель со знаком «+», располагаются так:

$$+ \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix},$$

образуя отрезок, совпадающий с главной диагональю, и два треугольника, симметричных относительно главной диагонали.

Элементы, произведения которых входят в определитель со зна-

ком «-», располагаются аналогичным образом относительно побочной диагонали:

$$- \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \mathbf{a_{13}} \\ a_{21} & \mathbf{a_{22}} & a_{23} \\ \mathbf{a_{31}} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{12}} & a_{13} \\ \mathbf{a_{21}} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & \mathbf{a_{33}} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & \mathbf{a_{23}} \\ a_{31} & \mathbf{a_{32}} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

Пример.

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \\ 6 & 0 & -3 \end{vmatrix} = 5 \cdot 1 \cdot (-3) + (-2) \cdot (-4) \cdot 6 + 3 \cdot 0 \cdot 1 - \\ - 6 \cdot 1 \cdot 1 - 3 \cdot (-2) \cdot (-3) - 5 \cdot 0 \cdot (-4) = 9.$$

2 Свойства определителей

1. Определитель не изменится, если к элементам какой-либо строки (столбца) прибавить соответствующие элементы параллельной строки (столбца), умноженные на любое число.

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{a_{11} + \alpha \cdot a_{21}} & \mathbf{a_{12} + \alpha \cdot a_{22}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} \end{vmatrix}$$

2. При перестановке местами двух параллельных строк (столбцов) знак определителя меняется на противоположный.

$$\begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} \\ \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} \end{vmatrix}$$

3. Общий множитель элементов какой-либо строки (столбца) определителя можно вынести за знак определителя.

$$\begin{vmatrix} \alpha \cdot \mathbf{a_{11}} & \alpha \cdot \mathbf{a_{12}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} \end{vmatrix} = \alpha \cdot \begin{vmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} \end{vmatrix}$$

4. Если элементы какой-либо строки (столбца) определителя представляют собой суммы двух слагаемых, то определитель может быть разложен на сумму соответствующих определителей.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

5. Определитель не меняется при транспонировании.

$$\det A = \det A^T$$

6. Определитель произведения двух квадратных матриц равен произведению определителей этих матриц.

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$$

3 Миноры и алгебраические дополнения

Определение

Минором M_{ij} элемента a_{ij} определителя n -го порядка называется определитель $(n - 1)$ -го порядка, который получается из определителя n -го порядка вычеркиванием строки и столбца, на пересечении которых стоит элемент a_{ij} , т.е. строки с номером i и столбца с номером j .

Пример

$$\text{Если } \Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 7 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \text{ то}$$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 5 \cdot 0 - 1 \cdot 7 = -7,$$

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 1 \cdot 7 - 0 \cdot (-2) = 7.$$

Определение

Алгебраическим дополнением A_{ij} элемента a_{ij} определителя n -го порядка называется число, равное $(-1)^{i+j} M_{ij}$.

Пример.

Если $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \\ -5 & -2 & 1 \end{vmatrix}$, то

$$A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = (-1)^2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 4 = 6,$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1)^5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 3) = -1.$$

4 Вычисление определителя произвольного порядка

Теорема (теорема разложения)

Определитель квадратной матрицы порядка n равен сумме произведений элементов любого ряда (строки или столбца) на их алгебраические дополнения.

Пример. Вычислить определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}.$$

Вычислим определитель с помощью разложения по строке. Для удобства вычисления выберем 2-ую строку, содержащую нулевой элемент ($a_{22} = 0$), поскольку при этом нет необходимости находить алгебраическое дополнение A_{22} , так как произведение $a_{22}A_{22} = 0$.

Итак,

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (-3 \cdot (-1) - 5 \cdot 1) = 2,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \cdot (2 \cdot 1 - (-3) \cdot 2) = -8.$$

Тогда $\Delta = a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} = 1 \cdot 2 + 0 + (-4) \cdot (-8) = 34$.

Ответ: $\Delta = 34$.

Замечание

Эта теорема позволяет свести вычисление определителя n -го порядка к определителю порядка $(n - 1)$. В целом громоздкая процедура, однако ее можно заметно упростить, если воспользоваться свойствами определителя, например, свойством 1, которое позволяет обнулить значительную часть элементов какого-либо ряда (строки или столбца). В этом случае исчезает необходимость считать существенную часть алгебраических дополнений, соответствующих нулевым элементам.

Пример. Вычислить определитель 4-го порядка

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -3 & 7 & -1 & 4 \\ 5 & -9 & 2 & 7 \\ 4 & -6 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Преобразуем определитель так, чтобы три из четырех элементов какой-либо строки или столбца стали равными нулю. Для этого воспользуемся свойством 1. Его особенно удобно применять, если в определителе существует элемент, равный ± 1 . Выберем в качестве такого элемента $a_{13} = 1$ и с его помощью обратим все остальные элементы 3-го столбца в нули. С этой целью:

- а) к элементам 2-й строки прибавим соответствующие элементы 1-й строки;
- б) из элементов 3-й строки вычтем элементы 1-й строки, мно-

женные на 2;

в) из элементов 4-й строки вычтем элементы 1-й строки (напомним, что при этом величина определителя не изменится).

Тогда получим

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 6 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

Разложим полученный определитель по 3-му столбцу. В этом случае нам достаточно посчитать только одно алгебраическое дополнение A_{13} , поскольку все остальные элементы 3-его столбца равны нулю, а произведение любого числа на нуль есть нуль.

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 6 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

Вычтем из элементов 1-й строки нового определителя удвоенные элементы 2-й строки:

$$\Delta = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

и разложим этот определитель по 1-й строке:

$$\Delta = -3 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \cdot 1 \cdot (0 - 3 \cdot (-1)) = -9.$$

Ответ: $\Delta = -9$.

В дальнейшем нам понадобится еще одна теорема.

Теорема (теорема аннулирования)

Сумма произведений элементов какой-либо строки (столбца) определителя на алгебраические дополнения к соответствующим элементам другой строки (столбца) равна нулю.

Пример. Рассмотрим определитель третьего порядка

$$\begin{vmatrix} -3 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}.$$

Найдем сумму произведений элементов первой строки определителя на алгебраические дополнения элементов второй строки. Тогда имеем:

$$\begin{aligned} & (-3) \cdot A_{21} + 1 \cdot A_{22} + 5 \cdot A_{23} = \\ & = (-3) \cdot (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = \\ & = (-3) \cdot (-1) \cdot (-15) + 1 \cdot 1 \cdot (-5) + 5 \cdot (-1) \cdot (-10) = \\ & = -45 - 5 + 50 = 0. \end{aligned}$$

Замечание

Определитель треугольной матрицы любого порядка равен произведению элементов главной диагонали.

Пример.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 12 & -4 & 7 \\ 0 & -3 & 15 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 12 \cdot (-3) \cdot 2 = -72.$$